

Abonnez-vous
gratuitement
aux BSV de la région
Occitanie



A retenir

ASPERGE

Criocères : Risque à surveiller
Puceron de l'asperge : Risque à surveiller
Rouille de l'asperge : Risque à surveiller mais important dans certains secteurs

MELON PLEIN CHAMP

Acariens : Risque fort
Pucerons : Risque en diminution
Mildiou : Risque à surveiller
Oïdium : Risque à surveiller
Virus : Risque à surveiller
Grille physiologique : Risque à surveiller

TOMATE

Tuta absoluta : Risque important
Pucerons : Risque stable
Botrytis : Risque stable
Noctuelles : Risque en augmentation
Carences : Risque en augmentation
Blossom end rot : Risque en augmentation
Punaies : Risque en augmentation
Mineuses : Risque stable
Acariens : Risque en augmentation
Cladosporiose : Risque bien présent
Aleurodes : Risque en forte augmentation
Oïdium : Risque stable

COURGETTE

Pucerons : Risque faible
Virus : Risque en augmentation
Oïdium : Risque en augmentation
Noctuelles : Risque stable
Aleurodes : Risque en augmentation
Cicadelles : Risque de présence en augmentation
Coup de chaud : Risque bien présent en cette période de fortes chaleurs
Punaies : Risque de présence en augmentation
Acariens : Risque stable

CONCOMBRE

Pucerons : Risque en augmentation
Acariens : Risque en augmentation
Oïdium : Risque en augmentation dans le Languedoc
Thrips : Risque stable
Punaies : Risque en augmentation
Mildiou : Risque bien présent
Aleurodes : Risque stable important
Virus : Risque en augmentation



Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :
CENTREX, Chambre
d'agriculture du Gard, DRAAF
Occitanie, SUDEXPE

écophyto
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

Action du plan Ecophyto pilotée
par les ministères en charge de
l'agriculture, de l'écologie, de la
santé et de la recherche, avec
l'appui technique et financier de
l'Office français de la Biodiversité

<u>POIVRON</u>	Pucerons : Risque stable important Noctuelles : Risque stable Virus : Risque stable Coup de soleil : Risque important
<u>AUBERGINE</u>	Pucerons : Risque stable Acariens : Risque en augmentation Thrips : Risque en augmentation Aleurodes : Risque en augmentation Punaies : Risque en augmentation Doryphore : Risque en augmentation
<u>HARICOT</u>	Acariens : Risque important
<u>PASTEQUE</u>	Pucerons : Risque en diminution Coup de soleil : Risque important Acariens : Risque en augmentation
<u>CHOUX</u>	Chenilles défoliatrices : Risque en diminution Pucerons : Risque en diminution Punaies : Risque en augmentation Altises : Risque en augmentation
<u>ARTICHAUT</u>	Chenilles défoliatrices : Risque en augmentation Fourmis et pucerons des racines : Risque à surveiller
<u>POTIMARRON</u>	Pucerons : Risque en diminution Acariens : Risque en augmentation Oïdium : Risque en augmentation Virus : Risque en augmentation
<u>BUTTERNUT</u>	Acariens : Risque en augmentation
<u>OIGNON</u>	Thrips : Risque en augmentation dans certaines parcelles



Téléchargez la note en cliquant sur la vignette ou consultez-la depuis la page [Ecophytopic](#)



Consultez la note nationale Focus **abeilles – pollinisateurs – réglementation** en cliquant [ICI](#)

METEO

- **Prévisions pour la période du 29 juillet au 3 août** (Source Météo France)

Département / Jour	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun
Gard						
Hérault						
Aude						
Pyrénées-Orientales						

Le temps chaud persiste sur l'ensemble du territoire. Des passages nuageux sont attendus dans la matinée de jeudi 30 dans l'Aude et l'Hérault puis plus fréquemment vendredi 31 juillet sur l'ensemble du territoire, avec des risques d'orages localisés, notamment dans l'ouest gardois, le Biterrois, les Corbières, la haute vallée de l'Aude et l'arrière-pays du Roussillon. Ces risques d'orages se poursuivent samedi 1^{er} août, toujours de façon localisée.

Des averses sont également possibles les 2 et 3 août sur le Biterrois, l'Aude et le Roussillon. Les niveaux de précipitations seront faibles.

Le régime de vent dominant s'appuie sur un flux de sud-sud-est faible (vent marin), qui atténue légèrement les températures sur le littoral (29-32°C), tandis que l'intérieur des terres conserve des maximales élevées (33-36°C, voire plus). Les températures minimales s'établissent autour de 22-26 °C.

FRAISES ET AUTRES FINS DE CULTURES

- **Solarisation**

Ce procédé thermique de désinfection (plusieurs pathogènes et ravageurs ainsi que des graines d'adventices) des sols consiste, grâce au rayonnement solaire, à faire monter en température un sol humidifié à la capacité au champ. L'eau stockée assure la transmission en profondeur (10-20cm) de la chaleur par conduction. La température atteinte dans le sol est de l'ordre de 35-40 °C. Pour ceux qui remettent des fraises il est possible de solariser directement sur de nouvelles buttes.

Il est conseillé d'alterner 1 an sur 2 (voire sur 3) la solarisation avec un engrais vert car la solarisation peut désorganiser la biodiversité dans le sol et réduire le taux de matière organique

Comment procéder ?

- Travailler le sol de manière assez fine ;
- Faire le plein en eau du sol ;
- Poser une bâche de solarisation transparente d'environ 30 -50 µm d'épaisseur en s'assurant **qu'il y ait une période ensoleillée d'au moins 4-5 j** pour que la montée en température puisse s'effectuer en particulier en plein champ (pour ceux qui débâchent les tunnels en été). Bien couvrir les bords des tunnels pour éviter que les adventices poussent et soulèvent la bâche. Faire une aspersion pour bien plaquer la bâche au sol.
- Fermer les tunnels pendant 4-5 j pour qu'il y ait une montée en température, puis ouvrir à nouveau les portes des tunnels sinon les bâches des tunnels et le système d'irrigation risquent de s'abîmer.
- Laisser la solarisation pendant environ 45j (60j en plein champ ou si les bâches des tunnels 4.5 ou 5m ont été retirées)
- A la fin de la solarisation, enlever la bâche et la recycler.
- Faire un travail de sol superficiel avant de planter vos plants de fraisiers en Août ou vos salades en septembre



Solarisation sous abris **A NE PAS FAIRE** – Photo CA30



Solarisation sous abris – Photos CA30

• Engrais vert :

- Mise en place d'un engrais comme un sorgho fourrager. Différentes variétés disponibles : Piper, Lussi, Sudal, Trudan8, Jumbo...
- Dose de semis assez dense : 40-50 kg/ha
- Dans les tunnels où le sorgho est déjà présent, possibilité de le détruire et de mettre en place une solarisation/biofumigation Il faut bien arroser durant les 2 jours précédant le broyage puis broyer et bâcher rapidement pour éviter que l'acide cyanhydrique contenu dans le sorgho soit perdu dans l'atmosphère. En effet, la dhurrine présente dans le sorgho se dégrade en acide cyanhydrique qui est un gaz toxique pour de nombreux pathogènes du sol.

- Il est également possible de faire de la **biofumigation** avec de la moutarde et notamment la variété **Etamine** mais aussi avec du **Sorgho** mais dans ce cas il faut une variété riche en Dhurrine comme Jumbo et Jumbo Star. Dans ce cas-là faire la culture, faire une aspersion avant le broyage puis la broyer (stade floraison pour la moutarde), puis l'enfourir et mettre immédiatement un film barrière (type bâche de solarisation) pour éviter que les gaz ne s'échappent dans l'atmosphère et restent bien dans le sol.



Engrais vert Sorgho – Photos CA30

ASPERGE

- **Stade des cultures :** Les récoltes sont terminées. Les parcelles sont en végétation. La fertilisation azotée doit bientôt être stoppée (fin juillet). Des apports trop tardifs peuvent provoquer un prolongement de la période végétative avec un départ indésirable de bourgeons du plateau en fin du cycle végétatif. La gestion de l'inter-rang est réalisée mécaniquement.



Asperge verte — Photo SUDEXPE



Asperge en végétation – Photo CA30

- **Criocères** (*Crioceris asparagi*)

Des criocères se font toujours voir (œufs et adultes). Traitement possible

Évaluation du risque : Risque à surveiller



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. [Liste des produits de bio-contrôle.](#) Contacter votre technicien



Criocerès œufs et adulte - Photo CAPL et SUDEXPE



œuf de criocerès – Photo CA30



• Puceron de l'asperge (*Brachycorynella asparagi*)

Être vigilant concernant la présence de pucerons de l'asperge. Ils sont présents de fin juin jusqu'à octobre, selon les régions. Observer les parcelles en réalisant des battages : secouer la partie basse du feuillage en mettant une feuille cartonnée blanche dessous afin de recueillir les insectes. Le puceron de l'asperge a une taille de 1,5 mm et présente une couleur vert-bleuté. Ils ne sont pas faciles à repérer parmi les asperges.



Puceron – Photo SUDEXPE

Évaluation du risque : Risque à surveiller

• Rouille (*Puccinia asparagi*)

De rares tâches de rouille sont détectées sur certaines. Les conditions climatiques chaudes et humides ou les rosées matinales sont favorables au développement de la rouille

Évaluation du risque : Risque à surveiller mais important dans certains secteurs

Mesures prophylactiques : de manière générale, limiter l'humidité au niveau de la parcelle :

- Privilégier le goutte à goutte à l'aspersion
- Eliminer les fanes très attaquées et sèches.
- Dans les secteurs humides, notamment en bord de cours d'eau, orienter les rangs dans le sens du vent dominant
- Choix de variétés qui craignent moins la rouille dans les secteurs à fort risque



Rouille de l'Asperge – Photo SUDEXPE



Rouille – Photos CA30

MELON SOUS ABRIS

- **Stade des cultures**

Les récoltes se terminent.

MELON PLEIN CHAMP

- **Stade des cultures**

Les récoltes des plantations de mi-mai sont en cours. La qualité et le rendement sont bons dans l'ensemble. Attention aux coups de soleil sur les fruits avec ces chaleurs, ne pas hésiter à blanchir les plants pour les cultures proches ou en cours de récolte. Le blanchiment peut se faire avec des produits à base d'argile comme le Kaolin à 50 kg/ha et avec un mouillage important. La situation phytosanitaire reste calme pour le moment, excepté la pression d'acariens.

- **Acariens** (*Tetranychus urticae*)

Avec ce climat chaud et sec, la pression d'acariens a rapidement évolué, surtout sur les variétés sensibles telles que Revel 160 et SV6556. Ne pas hésiter à traiter au débâchage en préventif et en curatif.

Évaluation du risque : Risque fort



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. [Liste des produits de bio-contrôle.](#) Contacter votre technicien.

- **Pucerons** (*plusieurs espèces*)

Les foyers de pucerons sont de moins en moins visibles, mais quelques petits sont toujours signalés. Être vigilant pour repérer les foyers et surveiller leur évolution.

Évaluation du risque : Risque en diminution



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. [Liste des produits de bio-contrôle.](#) Contacter votre technicien.
- En présence de foyers localisés, arracher les plants atteints.
- Il est possible de mettre en place des plantes relais pour amener de l'*Aphidius colemani*.

Mesures prophylactiques :

- Choisir des variétés IR Ag : résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron *Aphis gossypii*.
- Favoriser la présence d'auxiliaires indigènes comme les syrphes, chrysopes, coccinelles, *Aphidius colemani*.

- **Mildiou** (*Pseudoperonospora cubensis*)

Les cas de mildiou se sont estompés, mais il faut rester vigilant. Les pluies de ces derniers jours pourraient favoriser son développement. Ce pathogène apprécie les fortes hygrométries survenant en périodes de brouillards, de rosées et de pluies. La présence d'eau libre sur les feuilles est indispensable à l'infection.

Evaluation du risque : Risque à surveiller

Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.

Mesures prophylactiques : Privilégier la protection préventive.



Mildiou – Photo GOUT DU SUD

- **Oïdium** (plusieurs espèces)

Restez vigilant, il ne faut pas faire d'impasse.

Evaluation du risque : Risque à surveiller

Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.

Mesures prophylactiques :

- Préférer des variétés présentant des résistances intermédiaires.

- **Virus**

Dans certains secteurs nous commençons à voir quelques symptômes de New Dehli virus. Ce virus se transmet par les aleurodes *Bemisia tabaci*. Il est difficile d'empêcher sa contamination. A surveiller.

Evaluation du risque : Risque à surveiller

Mesures prophylactiques :

- Choisir des variétés avec des tolérances intermédiaires aux virus
- Couvrir au maximum les cultures avec du P17 ou du P14
- Détruire le DATURA qui est une plante hôte pour *Bemisia Tabaci*



DATURA- Photo CA30



Virus Melon - Photos CA30

• Grille physiologique

Dans certains secteurs nous observons quelques cas de grillures physiologiques.

Evaluation du risque : Risque à surveiller

Techniques alternatives :

- Utilisation possible en foliaire de produits à base de nitrate de calcium (2 à 3%) ou de sulfate de magnésie (3 à 6%).



Grille physiologique - Photo CA30

TOMATE

- **Stade des cultures : Floraison – Grossissement des fruits – Récolte**

• *Tuta absoluta*

Nous observons toujours la présence de *Tuta absoluta* avec notamment des dégâts sur les feuilles

Evaluation du risque : Risque important



Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien. Contacter votre technicien.

- Faire des **lâchers de trichogrammes** qui parasitent les œufs de Tuta
- **Enlever les feuilles touchées** mais pas plus, sinon on risque d'enlever les *Macrolophus* qui a une action de prédation sur les œufs et jeunes larves de Tuta lorsqu'il est bien installé.
- Mettre en place la **confusion sexuelle** au moyen d'1 diffuseur de phéromone pour 10m² (1000 diffuseurs/ha, soit 690 €/ha) avec renforcement sur les bordures. Confusion à mettre en place avant ou le jour de la plantation de la culture. Les diffuseurs doivent être suspendus à **80-100 cm du sol et ne pas trop enrouler les diffuseurs autour d'un fil sinon la diffusion ne se fera pas bien**. Durée d'application : 110-120 jours au printemps-été et 150-160 jours en automne-hiver.



Mise en place de la confusion - Photos JEEM



Dégâts de Tuta - Photos JEEM



Dégâts Tuta – Photo CA30

• Pucerons (*plusieurs espèces*)

Nous observons toujours une stabilisation des attaques de pucerons (elles restent cependant quelques fois importantes notamment en Bio), sur tomate. Nous observons une bonne installation des auxiliaires indigènes.

Evaluation du risque : Risque stable



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace notamment en les localisant sur les foyers. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.
- Sur foyer, possibilité de faire des lâchers de larves de chrysopes ; mais attention les températures nocturnes doivent être supérieures à 12°C
- Possibilité de mettre des plantes relais qui sont une sorte de réserve d'auxiliaires qui vont ensuite aller parasiter les pucerons sur les cultures. Sur la plante relais, les auxiliaires vont se développer grâce au puceron des céréales qui ne va pas sur les cultures maraîchères.



Foyers de pucerons - Photo CA30

• Botrytis (*Botrytis cinerea*)

Nous observons toujours des symptômes de botrytis sur tiges, sur fruits et même sur fleurs.

Évaluation du risque : Risque stable



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible sur jeunes chenilles. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.
- Bien aérer les abris.



Botrytis sur tige – Photo JEEM

• Noctuelles (*Plusieurs espèces*)

Nous observons toujours des attaques de noctuelles sur tiges et fruits en agriculture biologique. Bien surveiller les parcelles pour repérer les pontes et le premier stade larvaire.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- Bien surveiller les parcelles pour repérer les premiers stades larvaires
- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Chenille et œuf – Photos JEEM



Dégâts sur fruits – Photo CA30

• Carence

Nous observons régulièrement en cette période de grossissements / maturation des fruits des carences en magnésie (bas des plantes), des carences induites en potasse (milieu des plantes) mais aussi en fer (haut des plantes).

Evaluation du risque : Risque en augmentation.



Carence en magnésie – Photo CA30



Carence potasse – Photos JEEM



Chlorose en fer



Carence Magnésie - Photos JEEM-CA30


• Blossom end rot (Nécrose apicale ou Cul noir)

Comme chaque année, nous observons toujours de manière régulière la présence de nécrose apicale, plus communément appelée **Cul noir**.

Le Cul noir (Blossom end Rot) est lié à un manque de calcium dans la partie distale des fruits consécutif à un défaut d'absorption de cet élément par les racines :

Plusieurs paramètres peuvent en être à l'origine :

- une carence vraie en calcium ou un antagonisme de cet élément avec d'autres éléments du sol ou de la solution nutritive (NH_4^+ , NO_3^- , Mg^{++}) ;
- une salinité élevée induite par un arrosage insuffisant ou une conductivité électrique importante de la solution nutritive, limitant l'absorption du calcium ;
- une forte transpiration ;
- une croissance trop rapide des plantes et des fruits ;
- un système racinaire limité naturellement ou à la suite du développement de lésions d'origines biotiques (bioagresseurs racinaires) ou abiotiques (sol mal préparé, travail du sol mutilant pour les racines, asphyxie racinaire...), ceci réduisant l'absorption de l'eau et du calcium (voir le thème Asphyxie racinaire) ;
- des irrigations insuffisantes ou mal réparties dans le temps à l'origine d'une fluctuation trop importante de l'humidité du sol



Nécrose apicale – Photo CA30

Evaluation du risque : Risque en augmentation.

Mesures prophylactiques :

- bien gérer l'irrigation tant au niveau des quantités que de la régularité
- amener du calcium au goutte à goutte ou en foliaire

• Punaies (plusieurs espèces)

Nous observons toujours de manière régulière la présence de punaises, notamment *Nezara viridula* avec des dégâts sur les fruits.

Evaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives : Enlèvement manuel.



Punaises et dégâts - Photos CA30

- **Mineuses** (*plusieurs espèces*)

Nous observons toujours des dégâts de mineuses sur les feuilles, pour le moment le niveau d'attaque est faible mais il augmente

Evaluation du risque : Risque stable



Techniques alternatives : Sous abris FERMES, l'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficaces. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Galerie de mineuses et pupe - Photos CA30

- **Acariens** (*Tetranychus urticae*)

Nous observons une augmentation des attaques d'acariens pouvant aller jusqu'à la formation de toiles.

Evaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.
- Action secondaire intéressante de *Macrolophus pygmaeus* sur les petits foyers.
- Possibilité de faire des microaspersion en journée ensoleillée.



Dégâts acariens - Photo CA30

• Cladosporiose (*Passalora fulva*)

Nous observons toujours des symptômes de cladosporiose avec la présence de taches vert clair à jaune pâle sur la face supérieure des feuilles et un duvet blanchâtre puis violacé à brun sur la face inférieure. Risque bien présent notamment lorsqu'il y a des aspersions tardives.

Evaluation du risque : Risque bien présent.

Mesures prophylactiques :

- Éviter les bassinages et les irrigations par aspersion le soir.
- Aérer au maximum les tunnels pour réduire l'humidité.
- Réaliser un effeuillage de la base permet d'éliminer les premières feuilles attaquées et favorise l'aération des parties basses des plantes (attention cependant si vous avez fait des lâchers de *Macrolophus*, limiter l'effeuillage).
- Utiliser des variétés avec des résistances intermédiaires aux 5 races de *Passalora fulva* (Pf ; A-E).



Cladosporiose – Photo CA30

• Aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*)

Nous observons une forte augmentation des attaques d'aleurodes (adultes et larves).

Evaluation du risque : Risque en forte augmentation



Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace notamment en les localisant sur les foyers. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

- Il est possible de faire des lâchers de *Macrolophus pygmaeus* qui va consommer tous les stades d'aleurodes et aussi bien *Bemisia* que *Trialeurodes* mais aussi de parasitoïdes comme *Encarsia formosa* et *Eretmocerus eremicus*. Il existe aussi des prédateurs indigènes comme la punaise *Dicyphus*.



Aleurode **Trialeurodes** et **Bemisia** sur tomate - Photos JEEM

- **Oïdium** (*Pseudoidium neolycopersici*)

Nous observons des attaques d'oïdium aussi bien en AB qu'en agriculture raisonnée.

Evaluation du risque : Risque stable



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.
- Bien aérer les tunnels ou les multichapelles.



Oïdium – Photo CA30

COURGETTE

- **Stade des cultures :**

Reprise – Floraison – Récolte

- **Pucerons** (*plusieurs espèces*)

Nous observons toujours quelques attaques de pucerons en plein champ mais la pression reste faible. On note la présence d'auxiliaires prédateurs comme les syrphes, les coccinelles et les chrysopes mais les parasitoïdes.

Evaluation du risque : Risque faible



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace notamment en les localisant sur les foyers. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.
- Sur foyer, possibilité de faire des lâchers de larves de chrysopes ; mais attention les températures nocturnes doivent être supérieures à 12°C
- Possibilité de mettre des plantes relais qui sont une sorte de réserve d'auxiliaires qui vont ensuite aller parasiter les pucerons sur les cultures. **1 plante pour 100m²**



Pucerons – Photo CA30

- **Virus** (*Plusieurs espèces*)

Nous observons la présence de virus aussi bien sur les fruits que sur les feuilles. Sur certaines cultures sous abris, la présence de virus est très importante et les dégâts sur fruits sont très conséquents.

Évaluation du risque : Risque en augmentation.

Techniques alternatives :

Couvrir les cultures avec du P17 ou du P14 (directement sur la culture, dès la plantation et jusqu'à la floraison) pour limiter les piqûres de pucerons et d'aleurodes et retarder au maximum l'apparition des virus

Utiliser des variétés avec des Résistances Intermédiaires aux virus.



Virus sur fruit – Photo JEEM



Virus sur feuilles – Photos CA30



- **Oïdium** (*Podosphaera xanthii* et *Golovinomyces cichoracearum*)

Nous observons toujours des symptômes d'oïdium

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

- Prendre des variétés tolérantes à l'oïdium.



Oïdium sur courgette - Photo CA30

- **Noctuelles** (*Plusieurs espèces*)

En particulier en plein champ, nous observons toujours des chenilles avec quelques dégâts sur les fruits.

Évaluation du risque : Risque stable



Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible sur jeunes chenilles. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Œuf de noctuelle - Photo CA30

- **Aleurodes** (*Bemisia tabaci* et *Trialeurodes vaporariorum*)

Nous observons toujours des aleurodes et notamment des *Bemisia tabaci* qui peuvent transmettre le New Delhi Virus (Tomato Leaf Curl New Delhi Virus - ToLCNDV – Virus New Delhi des feuilles enroulées de la tomate).

Évaluation du risque : Risque en augmentation.



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.
- Détruire le DATURA qui est une plante hôte de Bemisia tabaci.



Trialeurodes vaporariorum



Bemisia tabaci



DATURA — Photos CA30

- **Cicadelles** (Plusieurs espèces)

Nous notons la présence de cicadelles en culture. Elles n'engendrent pas de dégâts pour le moment.

Évaluation du risque : Risque de présence en augmentation

- **Coup de chaud**

Nous notons la présence de coup de chaud sur les jeunes plantations

Évaluation du risque : Risque bien présent en cette période de fortes chaleurs



Larve de cicadelle – Photo CA30



Coup de chaud – Photo JEEM

- **Punaises** (Plusieurs espèces dont *Nezara viridula*)

Nous observons la présence de punaises sur les fruits et sur les feuilles mais pour le moment elles n'engendrent pas de dégâts

Evaluation du risque : Risque de présence en augmentation.



Techniques alternatives :

- Enlever les adultes manuellement
- Ecraser les ooplaques



Punaises – Photo JEEM

• **Acariens** (*Tetranychus urticae*)

Nous observons des attaques d'acariens mais les populations restent limitées

Evaluation du risque : Risque stable



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.



Acariens – Photo CA30

CONCOMBRE

• **Stade des cultures :** Croissance – Floraison - Récolte

• **Pucerons** (Plusieurs espèces)

Nous observons toujours des attaques de pucerons aussi bien en agriculture biologique qu'en agriculture raisonnée, avec l'apparition de fumagine sur certaines parcelles. Les conditions sont favorables, bien surveiller les parcelles.

Les auxiliaires sont toujours bien présents

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Biocontrôle :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.
- Il est possible de faire des lâchers de parasitoïdes comme *Aphidius colemani* (vrac ou plantes relais), *Aphidius ervi* et *Aphelinus abdominalis*. Possibilité de faire aussi des lâchers de prédateurs comme *Aphidoletes aphidimyza* et les coccinelles.
- Eviter les excès de fertilisation azotée et les excès de vigueur.
- Favoriser la faune auxiliaire



Foyers de pucerons – Photo CA30

- **Acariens (*Tetranychus urticae*)**

Nous observons toujours des acariens avec dans certains cas l'apparition de fumagine. Les conditions chaudes et sèches sont favorables. Bien surveiller les parcelles.

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives :

- Eviter les climats trop secs et chauds qui favorisent la prolifération des acariens.
- Bassiner le feuillage en période séchante.
- Assurer une bonne alimentation en eau des plantes pour favoriser l'évapotranspiration.
- Favoriser la faune auxiliaire
- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.



Acariens sur feuille – Photos CA30


- **Oïdium (*Podosphaera xanthii* et *Golovinomyces cichoracearum*)**

Nous observons toujours la présence importante de symptômes d'oïdium sous abri.

Évaluation du risque : Risque en augmentation dans le Languedoc

Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.



Dégât Oïdium - Photo CA30

- **Thrips** (*Thrips tabaci* - *Frankliniella occidentalis*)

En particulier dans le Languedoc, nous observons toujours la présence de thrips sur feuilles de concombre sous abris mais pour le moment les populations sont faibles.

Évaluation du risque : Risque stable



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.
- Possibilité de faire des lâchers d'*Amblyseius swirskii* (efficace aussi sur aleurodes) et de *Neoseiulus cucumeris*.



Dégâts thrips - Photo JEEM

- **Punaises** (plusieurs espèces)

Nous observons toujours la présence de punaises, notamment *Nezara viridula* avec pour le moment pas de dégâts.

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives : Enlèvement manuel.

- **Mildiou** (*Pseudoperonospora cubensis*)

Avec les conditions humides et orageuses que nous avons, nous observons des attaques de mildiou sur concombre d'abris.

Évaluation du risque : Risque bien présent



Techniques alternatives :

- Eviter les excès d'azote
- Bien aérer les abris par temps non pluvieux
- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et/ou contactez votre technicien.



Mildiou - Photos CA30

- **Aleurodes** (plusieurs espèces)

Nous notons toujours la présence d'aleurodes (Adultes et larves) sur certaines parcelles en particulier en agriculture biologique. Les attaques sont parfois très importantes avec la présence de miellat.

Évaluation du risque : Risque en stable important



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et/ou contactez votre technicien.
- Possibilité de mettre en place de panneaux chromatiques jaunes pour suivre les vols et faire du piégeage massif.



Aleurode larves et adulte et larve - Photos JEEM

- **Virus** (*Plusieurs espèces*)

En particulier dans le Languedoc, nous observons la présence de virus notamment sur les feuilles.

Évaluation du risque : Risque en augmentation.

Techniques alternatives :

- Utiliser des variétés avec des Résistances Intermédiaires aux virus.



Virus sur feuille – Photo JEEM

POIVRON

- **Stade des cultures** : Floraison - Récolte

- **Pucerons** (*Plusieurs espèces*)

Nous observons toujours des attaques de pucerons sur poivrons en sous abris.

Les auxiliaires sont aussi bien présents (coccinelles, parasitoïdes...). Bien surveiller les parcelles afin de vérifier l'équilibre auxiliaires / pucerons.

Évaluation du risque : Risque stable important

Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.
- Possibilité de faire des lâchers de parasitoïdes comme *Aphidius colemani* (vrac ou plantes relais), *Aphidius ervi*, *Aphelinus abdominalis* ou des prédateurs comme *Aphidoletes aphidimyza*.





Foyer de pucerons – Photo CA30



Larve de coccinelle – Photo JEEM

- **Noctuelles** (*Plusieurs espèces*)

Nous observons toujours la présence de dégâts de noctuelles défoliatrices sur les feuilles. Bien surveiller les parcelles afin de détecter les premiers stades larvaires.

Évaluation du risque : Risque stable

Prophylaxie :

- Surveiller les parcelles afin de détecter les plus jeunes stades larvaires

Biocontrôle :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible sur jeunes chenilles. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Dégâts de chenille- Photo JEEM

- **Coup de soleil**

Nous observons toujours de manière régulière des coups de soleil notamment au niveau des ouvrants ou chez ceux ayant mal ombré.... Présence aussi en plein champ

Évaluation du risque : Risque important

Mesures prophylactiques : bien ombrer les tunnels



Coup de soleil – Photo CA30

AUBERGINE

Stade des cultures : Croissance - Récolte

- **Pucerons** (*Plusieurs espèces*)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, nous observons des foyers de pucerons en particulier agriculture biologique (Dans le Languedoc, dans certains cas présence de fumagine). Les auxiliaires régulent les populations pour l'heure. Bien surveiller les parcelles pour repérer les premières formes volantes et vérifier l'équilibre pucerons / auxiliaires.

Évaluation du risque : Risque stable important



Biocontrôle :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.
- Il est possible de faire des lâchers de parasitoïdes comme *Aphidius colemani* (vrac ou plantes relais), *Aphidius ervi* et *Aphelinus abdominalis*. Possibilité de faire aussi des lâchers de prédateurs comme *Aphidoletes aphidimyza* et les coccinelles.
- Eviter les excès de fertilisation azotée.



Fumagine et pucerons sur fleurs – Photos CA30



Pucerons – Photo CIVAM BIO 66

• Acariens (*Tetranychus urticae*)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, les populations d'acariens sont en fortes augmentations, les conditions météorologiques sont favorables (temps chaud et sec). A des stades avancés, les plants jaunissent et la production peut être impactée. La pression est très forte.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Biocontrôle :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [clicquant ici](#) et contactez votre technicien.
- Il est possible de faire des lâchers de parasitoïdes comme *Aphidius colemani* (vrac ou plantes relais), *Aphidius ervi* et *Aphelinus abdominalis*.
- Bassiner les plantes pour augmenter l'humidité des abris
- Favoriser les auxiliaires (bandes fleuries, introduction...)



Acariens sur aubergine – Photos CENTREX

- **Thrips** (Plusieurs espèces)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, nous observons la présence de thrips en culture d'aubergine.

Dans le Languedoc les attaques peuvent être très importantes.

Dans le Roussillon, les dégâts sont pour l'heure limités à quelques piqures sur feuilles sans conséquences. Les conditions sèches et chaudes sont cependant favorables, bien surveiller les parcelles.



Thrips sur aubergine – Photo JEEM

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Biocontrôle :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.
- Bassiner les plantes pour augmenter l'humidité des abris
- Favoriser les auxiliaires (bandes fleuries, introduction...)

- **Aleurodes** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*)

Nous observons toujours la présence d'aleurodes sur certaines cultures notamment en AB

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace notamment en les localisant sur les foyers. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

- Il est possible de faire des lâchers de *Macrolophus pygmaeus* qui va consommer tous les stades d'aleurodes et aussi bien *Bemisia* que *Trialeurodes* mais aussi de parasitoïdes comme *Encarsia formosa* et *Eretmocerus eremicus*. Il existe aussi des prédateurs indigènes comme la punaise *Dicyphus*.



Bemisia tabaci – Photo CA30



Macrolophus – Photo JEEM

- **Punaises** (*Nezara viridula*)

En particulier dans le Roussillon nous observons des avortements de fleurs et de têtes liées à des attaques de punaises, dont la verte : *Nezara viridula*. D'autres espèces peuvent être présentes en culture. Les populations sont en augmentation avec la présence de stades larvaires.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Luttes alternatives :

- Ecraser les larves et les œufs à la main
- Mettre des filets aux ouvertures des tunnels pour limiter les entrées
- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien



Larves de Nezara V. sur aubergine et dégâts – Photos Centrex


• Doryphore (*Leptinotarsa decemlineata*)

Nous observons des attaques de doryphores (dégâts sur les feuilles), qui peuvent être très importantes notamment en Bio.

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.
- Ramassage manuel si la surface le permet
- Fabrication de ramasseuse automatique



Adulte – Photo CA30

HARICOTS

Stade des cultures : Croissance - Récolte


• Acariens (*Tetranychus urticae*)

Nous observons toujours des attaques d'acariens sur haricot avec généralement de fortes pressions

Évaluation du risque : Risque important

Techniques alternatives :

- Eviter les climats trop secs et chauds qui favorisent la prolifération des acariens.
- Bassiner le feuillage en période séchante.
- Assurer une bonne alimentation en eau des plantes pour favoriser l'évapotranspiration.
- Favoriser la faune auxiliaire
- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.



Dégâts acariens – Photo CA30

PASTEQUE

- **Stade des cultures :** Croissance Grossissement des fruits - Récolte.
- **Pucerons** (*plusieurs espèces*)

Nous observons toujours la présence de pucerons qui est quelques fois très importante notamment en agriculture biologique en plein champ. Les conditions sont favorables, bien surveiller les parcelles

Nous notons la très bonne installation des auxiliaires indigènes et en particuliers les coccinelles

Evaluation du risque : Risque en diminution

Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.

- En présence de foyers localisés, arracher les plants atteints.

- En particulier en sous abris, il est possible de mettre en place des plantes relais pour amener de l'*Aphidius colemani*.

Mesures prophylactiques :

- Favoriser la présence d'auxiliaires indigènes comme les syrphes, chrysopes, coccinelles, *Aphidius colemani*.



Foyers de pucerons - Photo CA30

Coup de soleil

Nous observons toujours de manière régulière des coups de soleil

Evaluation du risque : Risque important

Acariens (*Tetranychus urticae*)

Nous observons toujours des attaques d'acariens sur pastèques qui peuvent dans certains cas être très importantes avec la présence de toiles.

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives :

- Eviter les climats trop secs et chauds qui favorisent la prolifération des acariens.

- Bassiner le feuillage en période séchante.

- Assurer une bonne alimentation en eau des plantes pour favoriser l'évapotranspiration.

- Favoriser la faune auxiliaire

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.



Coup de soleil – Photo CA30



Acariens sur feuille – Photo CA30

CHOUX

Stade des cultures : Reprise

• Chenilles défoliatrices (*plusieurs espèces*)

Nous observons toujours quelques attaques de chenilles défoliatrices dont des piérides du chou.

Évaluation du risque : Risque en diminution

Techniques alternatives :

- Surveiller les parcelles afin de détecter les plus jeunes stades larvaires
- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible sur jeunes chenilles. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Piéride du chou - Photo CA30

• Pucerons (*plusieurs espèces*)

Nous observons toujours des attaques de pucerons notamment en agriculture biologique.

Évaluation du risque : Risque en diminution

Techniques alternatives :

- Eviter les excès de fertilisation azotée
- Planter des plantes attractives auxiliaires à proximité des parcelles.
- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Foyers de Pucerons – Photo CA30

• Punaises (*Type Eurydema Ornata*)

Nous observons toujours des attaques de punaises sur jeunes plantations avec aussi la présence d'ooplaques et d'éclosions qui indiquent que les populations vont fortement augmenter. Les traces de piqûres sur les feuilles sont bien visibles et quelques fois très importantes notamment en Bio

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives : Repérer les ooplaques et les premiers stades larvaires (blanc et noir). Ecraser les foyers.



Punaises – Photo CA30

• Altises (*Phyllotreta nemorum*)

Nous observons des attaques d'altises qui peuvent être très importants notamment en AB avec d'importants dégâts sur les feuilles.

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Méthodes prophylactiques : Mise en place de filets, de préférence sur arceaux



Altise et dégâts — Photos CA30

ARTICHAUT

- **Stade des cultures** : Reprise - Croissance – Données Roussillon

- **Chenilles défoliatrices** (*Plusieurs espèces*)

Sur les jeunes plantations de petit violet, nous observons une augmentation des dégâts liés aux noctuelles. La pression est forte. Bien surveiller les parcelles pour repérer les jeunes larves (stades L1, L2) afin de pouvoir intervenir avec des produits alternatifs.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- Favoriser les oiseaux
- Bien surveiller les parcelles pour repérer les premiers stades larvaires sensibles aux produits alternatifs
- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

- **Fourmis** (*Plusieurs espèces*) et **Pucerons des racines** (*Protrama radialis*)

Suite aux plantations, des fourmis peuvent être présentes sur les parcelles, ce sont souvent les premiers indicateurs de pucerons des racines qu'elles protègent. Surveiller la présence des fourmis pour repérer les pieds atteints et valider le diagnostic.

Évaluation du risque : Risque à surveiller



Techniques alternatives :

- Bien surveiller les parcelles pour repérer les fourmis
- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

POTIMARRON PLEIN CHAMP

- **Stade des cultures** : Croissance

- **Pucerons** (*Plusieurs espèces*)

En particulier dans le Roussillon, nous n'observons pas d'évolution des attaques de pucerons cette semaine. Leur présence en stable voir en diminution.

Évaluation du risque : Risque en diminution



Techniques alternatives :

- Eviter les excès de fertilisation azotée et les excès de vigueur.
- Favoriser la faune auxiliaire
- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible.. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

• Acariens (Plusieurs espèces)

En particulier dans le Roussillon des foyers d'acariens ont été observés cette semaine, la pression est en augmentation en raison des conditions climatiques chaudes et sèches favorables.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Biocontrôle :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle.](#) Contacter votre technicien.
- Bassiner les plantes pour augmenter l'humidité des abris
- Favoriser les auxiliaires (bandes fleuries, introduction...)

• Oïdium (Plusieurs espèces)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon nous notons l'apparition de quelques taches d'oïdium en culture. Les attaques sont faibles. Bien surveiller les parcelles.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Biocontrôle :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle.](#) Contacter votre technicien.
- Eviter les excès de fertilisation azoté et les plantes trop végétatives
- Eliminer les adventices pour éviter les contaminations
- Favoriser les auxiliaires (bandes fleuries, introduction...)



Oïdium sur courge — Photo CA30

• Virus

En particulier dans le Languedoc, nous observons quelques symptômes de virus sur feuilles et sur fruits et notamment là où il n'y a pas eu de protection physique avec notamment du P17 ou du 500 trous

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Mesures prophylactiques :

- Choisir des variétés avec des tolérances intermédiaires aux virus
- Couvrir au maximum les cultures avec du P17 ou du P14



Virus Potimarron - Photos CA30

BUTTERNUT PLEIN CHAMP

- **Stade des cultures :** Croissance des fruits

- **Acariens** (*Plusieurs espèces*)

En particulier dans le Roussillon nous notons quelques foyers d'acariens en culture à des niveaux faibles. Bien surveiller les parcelles car la pression est en augmentation et les conditions climatiques chaudes et sèches sont favorables. Vérifier l'équilibre auxiliaires / acariens

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Biocontrôle :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.
- Bassiner les plantes pour augmenter l'humidité des abris
- Favoriser les auxiliaires (bandes fleuries, introduction...)

OIGNON

- **Stade des cultures :** Croissance – Début récolte

- **Thrips** (*Thrips tabaci*)

Dans certaines parcelles nous observons de fortes attaques de thrips bloquant le grossissement de l'oignon

Évaluation du risque : Risque en augmentation dans certaines parcelles



Biocontrôle :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.
- Faire des aspersions pour noyer les thrips



Thrips - Photo CA30

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

Prochain bulletin le 12/08/2026

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Le bulletin de santé du végétal a été préparé par les animateurs filière maraîchage de la Chambre d'agriculture du Gard, CENTREX et SUDEXPE et a été élaboré sur la base des observations réalisées, tout au long de la campagne, par les Chambres d'agriculture de l'Hérault, du Gard et du Roussillon, Cathy Conseil, X. Dubreucq, OP Goût du Sud, la CAPL, JEEM, le CIVAM Bio 66.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre
de la stratégie **ecophyto**

